


Expérimentation EMO CSTASE 83

Equipe **M**obile **C**hirurgicale de
Stabilisation des **T**raumatisés **A**vant
Solutions d'Évacuation

EMoCSTASE 83



Déclenchement :

Critères :

Médicaux :

Choc hémorragique (PAS < 90 mmHg après remplissage vasculaire ou amines vasopressives ou arrêt cardiaque récupéré)

Echec d'hémostase d'une lésion périphérique (lésion vasculaire des membres)

+/-Geste chirurgical nécessaire pour la désincarcération

Logistiques :

Délai de transport sur l'HIA Sainte Anne >1h30

Critères d'exclusion :

Arrêt cardiaque non récupéré

Mydriase bilatérale ne régressant pas après osmothérapie (en l'absence d'utilisation d'adrénaline)

Pédiatrie < 15 ans et trois mois

Gestes chirurgicaux

Trauma abdominal instable	Laparotomie écourtée, Packing, ReBOA
Trauma bassin instable	Packin pelvien, ReBoA
Plaie vasculaire non garotable	Ligature temporaire, shunt
Trauma thorax hémorragique	Thoracotomie d'hémostase
Plaie du cœur (y compris cliniquement stable)	Cardiomyographie

Evacuation= poursuite du damage control ressucitation:
(Emocstase +SMUR)
Transfusion massive
Réchauffement
Amines vasopressives